

Tistelsnyltrot *Orobanche reticulata* vid Hokällan

- 22 stänglar Lat 58,1439 long13,6031 N 6445584,81 E 417762,86
- 5 stänglar Lat 58,144 long 13,6044 N 6445592,71 E 417841,91
-

Vid Ällebergs äne, på båda sidor om hokällan har tistelsnyltrotten börjat att blomma. Ett 20-tal stänglar finns c.a 50 meter från Hokällan mot sSynnerål.

Från Virtuella floran <http://linnaeus.nrm.se/flora>

Tistelsnyltrot är en parasitisk, klorofyllfri, körtelhårig ört. Stjälken är ganska grov, gulaktig till något violett och blir upp till en halv meter hög. Arten blommar i juli-augusti, blommorna har stödblåd men saknar förblad. Fodret består av två hela flikar som når till ungefär halva krontubens längd. Kronan är gul med violetta nerver, den är tvåläppig och har hela nedre flikar. Blommorna har mörka körtelhår på utsidan. Ståndarna är kala och märket violett eller rödaktigt.

Utbredning. Tistelsnyltrot är mycket sällsynt och förekommer bara i Skåne och Västergötland. Den parasiterar på [brudborste](#) (*Cirsium helenioides*) och [kältistel](#) (*C. oleraceum*) och påträffas vanligen på något fuktig, kalkrik mark. **Första fynduppgift** är från Mösseberg i Västergötland och publicerades av S. J. Lindgren i *Botaniska Notiser* 1842 (Nordstedt 1920). Enligt Lindgren hittades arten av Mathesius och flera exemplar insamlade av honom finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar

Brudborste *Cirsium helenioides*

Brudborste eller borsttistel är en nästan tornlös tistel med stora blomkorgar. Arten är flerårig och har krypande underjordiska utlöpare. Stjälken kan bli upp till en och en halv meter hög och är ogrenad eller har ibland ett fåtal grenar. De nedre bladen är hela, medan de övre är hela eller djupt parflikiga, bladundersidorna är vitludna och ofta nästan silverglänsande. Brudborste blommar i juli-augusti. Blomkorgarna är stora och sitter ensamma eller få tillsammans i toppen av stjälken. Blommorna är vackert rödvioletta eller sällan vita.

Brudborste kan knappast förväxlas med andra arter, men den kan bilda hybrider med [jordtistel](#) (*C. acaule*), [kältistel](#) (*C. oleraceum*), [kärrtistel](#) (*C. palustre*) och [åkertistel](#) (*C. arvense*).

Utbredning. Brudborste är vanligast i norra Sverige men den förekommer ända ner i Skåne, på Öland är den dock sällsynt och arten är inte funnen på Gotland. Den växer på fuktig mark, ofta på humusrik jord, på ångar, i skogsbryn etc.



Tistelsnyltrot



Brudborste